



**ИНСТРУКЦИЯ****по медицинскому применению лекарственного препарата***(для специалистов)***ГЕКСИКОН®****Торговое название препарата:** Гексикон®**Международное непатентованное название:** хлоргексидин**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные**Состав на один суппозиторий:***действующее вещество:* хлоргексидина биглюконат – 16 мг (в виде хлоргексидина биглюконата раствора 20 % - 85,2 мг);*вспомогательные вещества:* смесь макроголов: макрогол 1500 – (92 – 98) %, макрогол 400 – (8 – 2) % - до получения суппозитория массой 3,10 г.**Код АТС:** G01AX**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний**Описание**

Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

**Фармакологические свойства**Гексикон® - антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Bacteroides fragilis*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Гексикон® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.*Фармакокинетика:* при интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.**Показания к применению**

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.).

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве-гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до




и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в том числе неспецифических, смешанных, трихомонадных).

#### **Способ применения и дозы**

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.



Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Для профилактики венерических заболеваний: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после незащищенного полового акта.

В связи с низкой системной абсорбцией изменения режима дозирования у пациентов с нарушением функции печени, почек и пациентов пожилого возраста не требуется.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (сыпь, зуд), жжение. Хлоргексидин в очень редких случаях (<0,0001%) может вызывать реакции повышенной чувствительности, включая тяжёлые аллергические реакции и анафилаксию.

В отдельных случаях возможно появление сукровичных выделений из влагалища (см. раздел «Меры предосторожности»).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

#### **Меры предосторожности**

При возникновении неприятных ощущений после введения суппозитория (зуда, жжения) применение препарата следует прекратить.

При применении препарата возможно увеличение количества выделений из влагалища. Как правило, при небольшом количестве прозрачных выделений лечение препаратом можно не прерывать. При появлении сукровичных выделений рекомендуется прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

После контакта с препаратом следует вымыть руки, во избежание возможного попадания хлоргексидина в глаза.



Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев, т.к. препарат применяется интравагинально.

**Применение при беременности и лактации**

Не противопоказан во время беременности, в период лактации.

**Применение у детей**

Суппозитории вагинальные Гексикон<sup>®</sup>, содержащие 16 мг хлоргексидина биглюконата, не предназначены для применения у детей младше 15 лет. В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон<sup>®</sup> Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Гексикон<sup>®</sup> не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев вагинальных Гексикон<sup>®</sup>, т.к. препарат применяется интравагинально.

**Форма выпуска**

Гексикон<sup>®</sup>, суппозитории вагинальные 16 мг. Пять суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

