

**ИНСТРУКЦИЯ****по медицинскому применению лекарственного препарата***(для специалистов)***НАТАЛЬСИД®****Торговое название препарата:** Натальсид®**Группировочное название:** Натрия алгинат**Форма выпуска:** суппозитории ректальные**Состав:**

Один суппозитории содержит:

*действующее вещество:* натрия алгинат - 250 мг; *вспомогательные вещества:* жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) - до получения суппозитория массой 2,25 г.

**Описание:** суппозитории торпедообразной формы белого с коричневатым оттенком, или светло-коричневого, или светло-серого с коричневатым оттенком цвета, допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** Гемостатическое средство для местного применения.**Код АТХ:** B02BC**Фармакологические свойства*****Фармакодинамика***

Действующее вещество препарата – натрия алгинат – природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Оказывает выраженное гемостатическое, противовоспалительное и репаративное действие.

***Фармакокинетика***

Не описана.



**Показания к применению**

Хронические анальные трещины в стадии эпителизации, хронический кровоточащий геморрой, проктосигмоидит и воспалительные явления в прямой кишке в послеоперационном периоде.

**Способ применения и дозировка**

Ректально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки. Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы.

Взрослым и детям старше 14 лет - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.



Длительность курса лечения препаратом Натальсид® составляет 7-14 дней.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 14 лет).

#### **Передозировка**

Случаи передозировки неизвестны.

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

#### **Меры предосторожности**

##### ***Применение у детей***

Данные о безопасности и эффективности применения у детей в возрасте до 14 лет, подтвержденные в контролируемых клинических исследованиях, отсутствуют.

Препарат противопоказан в детском возрасте (до 14 лет).

Применение лекарственного средства необходимо осуществлять под наблюдением врача.

##### ***Применение в период беременности и кормления грудью***

Препарат Натальсид® не противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

##### ***Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами***

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами, работе с механизмами.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых лекарственных взаимодействий отмечено не было.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**


Без рецепта.

#### **Упаковка**

Суппозитории ректальные 250 мг.

5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом.

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению



лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)

