


ИНСТРУКЦИЯ

(для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного препарата

ВИТАПРОСТ®



Торговое название препарата: Витапрост®

Международное непатентованное название: отсутствует

Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Состав на одну таблетку:

состав ядра: действующее вещество - простаты экстракт – 100 мг (в пересчете на водорастворимые пептиды – 20 мг); *вспомогательные вещества:* сахароза – 28,500 мг, лактозы моногидрат – 7,125 мг, кальция стеарат – 2,500 мг, кросповидон – 9,275 мг, целлюлоза микрокристаллическая – до 102,600 мг;

состав оболочки: акрил-из (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] – 40%, титана диоксид – 14,4%, тальк – 37,25%, триэтилцитрат – 4,8%, кремния диоксид коллоидный – 1,25%, натрия гидрокарбонат – 1,2%, натрия лаурилсульфат – 0,5%, индигокармин – 0,6%) – 25 мг.

Описание:

Таблетки от голубого до светло-синего цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается наличие вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа:


Другие урологические средства.

Код АТХ: G04ВХ.

Фармакологические свойства


Фармакодинамика

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения



тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

На основании данных клинических исследований препарат Витапрост® умеренно уменьшает объём предстательной железы, уменьшает выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объёмных скоростей потока мочи и уменьшении объёма остаточной мочи.



Данные клинических исследований доказали, что применение препарата Витапрост® уменьшает вероятность развития обострений хронического абактериального простатита, не вызывает изменений показателей клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Эффективность применения препарата Витапрост® для профилактики обострений хронического абактериального простатита по оценкам врачей-исследователей составляет 97,5%.

Витапрост® нормализует параметры секрета предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, вызванные простатитом, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике отсутствуют.

Показания к применению

В комплексной терапии хронического абактериального простатита.

Профилактика обострений хронического абактериального простатита.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость лактозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу и сахарозу).


Способ применения и дозы

Внутри, по 1 таблетке 2 раза в день.



Длительность курса лечения препаратом Витапрост® при доброкачественной гиперплазии предстательной железы – не менее 30 дней, при хроническом простатите – не менее 10 дней.

Для профилактики обострений хронического простатита применяют по 1 таблетке 2 раза в день в течение не менее 30 дней – 1-2 раза в год.



Побочное действие

Крайне редко – аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Меры предосторожности

Лечение хронического простатита и состояний до и после оперативных вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением таблеток Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

Применение в период беременности и лактации

Препарат не применяется у женщин.

Применение у детей

Применение препарата у детей противопоказано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности



3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

7514 - 2020

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

